

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 469

DLP-6-10-82047-43

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

85,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.  
Sous-Régisseur de Recettes  
du Service de la Protection  
des Végétaux  
Cité Administrative - Rue Pélissier  
63034 Clermont Ferrand Cedex  
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN n° 28 DU 27 SEPTEMBRE 1982 - ÉDITION GÉNÉRALE

## GRANDES CULTURES

### COLZA

#### GROSSE ALTISE

Les renseignements fournis par le réseau de piégeage sont les suivants

#### \* Dans la HAUTE-VIENNE

Selon les dates de semis, les colza atteignent le stade cotylédonaire - 1 feuille.

*Aucune capture n'a été enregistrée pour le moment.*

#### \* Dans l'ALLIER

Stade : 3 - 4 feuilles.

Les captures sont importantes à NADES, SAINT DIDIER LA FORET, SAINT GERAND DE VAUX.

Un traitement est à envisager, afin d'éviter les pullulations de larves dans les pétioles.

#### \* Dans le PUY-DE-DOME

Stades très échelonnés (du stade cotylédonaire à 3 feuilles étalées).

Les captures sont très faibles à VASSEL, MEZEL, région d'ISSOIRE.

*Aucun traitement n'est à envisager pour l'instant.*

*Il est nécessaire de suivre attentivement les parcelles ; pour le seuil d'intervention, se reporter au Bulletin n° 27 du 10 Septembre.*

#### TENTHREDE DE LA RAVE

La présence de larves de ces ravageurs a été décelée dans quelques parcelles de colza. Les dégâts peuvent être importants (destruction complète du feuillage).

*Il y a lieu d'intervenir avec un des produits utilisés contre la grosse altise.*

### CEREALES

#### DESHERBAGE DE PRELEVÉE



Le désherbage de prélevée est conseillé sur :

- Les semis précoces
- les parcelles habituellement sales
- les parcelles où l'on pénètre difficilement au printemps (même dans le cas de semis tardifs).

**TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES  
EN PRELEVÉE**

			EPOQUE APPLICATION							MAUVAISES HERBES								
			SEMIS	LEVÉE	1 feuille	3 feuilles	1 talle	plein tallage	Doses (kg ou l) pc/ha	Graminées					Dicot.			
										folle avoine	Ray-grass	Paturin	Vulpin	Agrostis	Gaillet	Matricaire	Véronique	
AVADEX BW, TRIAMYL		Blé tendre	**							3,5	+	+	++	++	++			
AVADEX BW granulé	**	Orge	**							20	+	+	++	++	++			
Spécialités à base de Neburon	**	**								2 500 à 3 600 g M. A.				++	++		++	
TREPLIK	**	**								BLE : 4 ORGE : 5	+	+	++	++	++	++	++	
ESCURAN		**								5		++	++	++	++	++	++	
TRAPAN	**	**								2,5		+	++	++	++	++	++	
NORLAN T, GRANALINE 500	**	**								5			++	++	++	++	++	
CEREPRON NB	**	**								10				++	++	++	++	
PRODIG	**	**								6 - 7	+	+	++	++	++	++	++	
TOK E 25 TOK W P 50	**									8 - 12		++	++	++	++	++	++	
HERBALT, HERBALT S	**									7		++	++	++	++	++	++	
TOLION 303	**									7		++	++	++	++	++	++	
CHANDOR	**	**								4		+	++	++	++	++	++	
IGRANE autosuspendible	**									4		+	++	++	++	++	+	
TRIBUNIL	**									4			++	++	++	++	++	
DICURAN	**	**								2 000 à 2 500 g M. A.	+	++	++	++	++	++	++	
FERMAX TERSIPLÈNE	**	**								4		++	++	++	++	++	++	
BOCHAMP	**	**								6		++	++	++	++	++	++	

**\*\*** Traitement possible  
☐ Traitement déconseillé

 possibilité de traitement  
 risque de phytotoxicité en cas de froid

**++** Résultat satisfaisant  
**+** Résultat moyen  
**-** Efficace en levée d'automne  
☐ Résultat insuffisant

**Sensibilité aux herbicides**

Variétés sensibles au chlortoluron (DICURAN)

Abo, Aiglon, Alto, Arminda, Aviso, Carat, Cargo, Corin, Eloi, Heima, Hobbit, Kinsmann, Magister, Marignan, Maris, Huntsmann, Match, Nautica, Remois, Riol, Rotonde, Scipion, Valmy.

Variétés moyennement sensibles au chlortoluron

Albatros, Allégre, Aquila, Axel, Braco, Capitole, Caton, Charles Péguy, Cocagne, Copain, Favori, Fidel, Fregate, Gala, Iano, Marengo, Talent, Tango.